Atelier Euro-Méditerranée des pathologies
neuromusculaires

Filnemus

Marseille , 19-20 juin 2025

Vignettes cliniques

Les syndromes myotoniques

Dr Djamila MAHMOUDI

Neurologue

Alger (Algérie)

Vignette clinique 1: Nabil 16 ans

- CS : négative
- 2/2 enfants
- Pas cas similaires (selon la maman)
- Symptômes (maman) : Myalgies et raideurs avec difficultés à monter les escaliers
- Depuis l'âge de 14 ans (s'est adapté)
- Pas d'aggravation
- Difficultés scolaires
- Examen neurologique :
 - Amyotrophie généralisée et « harmonieuse »
 - Pas de déficit moteur
 - Pas de gros mollets
 - Démarche lente , traitante
 - ROT : présents mais un peu faibles
- CK 500

Photo non autorisée (par la maman)

- Positon un peu guindée
- Longiligne , maigreur (impression de scapula-alata)
- Raideurs articulaires ? Rétractions tendineuses ?

Photo non autorisée (par la maman)

- Faciès émacié (joues creuses)
- Zones temporales : Dégarnies
- Paupières un peu tombantes sans ptosis vrai
- Le couple : La pédiatre : SMA type III
L'interniste : PM chronique
- ENMG : SMA/ PM /Autres ?
- Génétique non disponible (SMA ?)

Nabil :

« Raideurs musculaires gênantes qui s'améliorent par la répétition des mouvements »

« J'ai des difficultés à lâcher mon stylo , je suis tout le temps en retard par rapport mes copains »

Des difficultés à lâcher un objet : Myotonie (symptôme)

Lenteur anormale de la décontraction musculaire

Une poignée de main

Myotonie spontanée

Myotonie provoquée (mécanique)

Myotonie électrique (ENMG)

Œil de la pédiatre : SMA type III

Œil de l'interniste : PM chronique

Œil du neurologue

Faciès

Myotonie clinique

Physionomie

Dystrophie myotonique de Steinert

MNM à transmission AD

- Clinique : **Myotonie**
- HyperCK (parfois)
- ENMG : Repos: **Salves myotoniques**

Tracé à l'effort : **myogène**

Test d'effort bref : un effet amplificateur du froid (diminution significative mais transitoire de l'amplitude du potentiel global d'action musculaire après le premier test d'effort bref).

- Génétique : **Confirmation**

Vignette clinique : Nabil 16 ans, ENMG

Stimulo-détection:

VCM normale

VCS : Normale

Détection

Activité de repos

Tracé à l'effort

Etat physiologique
Repos : tracé plat
Effort : tracé normal

Repos
Nabil

2

Décharges myotoniques
Tracé myopathique.

0.2 mV/D 300 ms/D

Etiologies

MALADIES MYOTONIQUES

Décharge
myotonique

20-80 Hz (parfois 150)

Diminue Progressivement

Piqué d'avion

insertion

contraction

percussion musculaire

Renforcé par le froid

hyperexcitabilité
de la f.m.

Décharges myotoniques

C'est la variation de la fréquence
un son musical caractéristique
« bombardier en piqué ».

Fréquence

Amplitude (Variable)

Fréquence

Son

Survenue

Physiopatho.

Décharges
complexes
répétitives
(pseudomyotoniques)

Fréquence

Amplitude

Fréquence

Son

Survenue

Physiopatho.

NEUROPATHIE MYOPATHIE

Décharge
répétitive complexe

10-50 Hz

Stable

Stable

bateau à moteur

spontanée

insertion

exc. éphaptique et
cyclique de f.m.

MALADIES
MYOTONIQUES

Décharge
myotonique

20-80 Hz

Variable (Dim et
augt
Dim
progressivement

Amplitude
Fréquence

Son
Survenue

avion en piqué
insertion
contraction
percussion mus.

Physiopatho.

hyperexcitabilité
de la f.m.

NEUROPATHIE
MYOPATHIE

Décharge
répétitive complexe

5-100 Hz

Stable
Stable
Début et fin
brusques

bateau à moteur
spontanée
insertion

exc. éphaptique et
cyclique de f.m.

0.3 mV/D 30 ms/D

Vignette clinique 4: Nabil 16 ans

Steinert : Clinique et ENMG

Maladie AD → Cas similaires ?

- Mutation de Novo Interrogatoire « POLICIER »
- Papa : DM type 1 (Steinert)
- Maman → Déni /Avoir un autre avis / Erreur médicale !
 - Souffrance psychologique des parents
 - Annonce Dc , accompagnement :
- Education thérapeutique

Ni SMA / Ni PM

Maladie de Steinert (DM1)

Tracé d'effort : Neurogène

Myopathique

NEUROLOGÍA

www.elsevier.es/neurologia

CONSENSUS STATEMENT

Clinical guide for the diagnosis and follow-up of myotonic dystrophy type 1, MD1 or Steinert's disease ☆,☆☆

Syndromes myotoniques de l'enfant

SM dystrophiques

Maladie de Steinert
DM1

PROMM
DM2

Syndromes non dystrophiques

La myotonie congénitale de Becker

La myotonie congénitale de Thomsen

Les myotonies du canal sodium

La paramyotonie congénitale

Dystrophie myotonique type I Steinert

- Une maladie neuromusculaire, rare, d'origine génétique.
- AD
- Pénétrance variable lié à un phénomène d'anticipation
- **Multisystémique**
- Répétition en nombre anormalement élevé triplet de nucléotides CTG 50- plusieurs millier (normale 5-37) , au niveau **du gène DMPK** (Dystrophia Myotonica Protein Kinase) sur **le chromosome 19**.

5 formes de la maladie, en fonction de l'âge d'apparition des symptômes :

- À la naissance (forme congénitale), **hypotonie**
(Transmise quasi-exclusivement par la mère (alors que les autres formes sont transmises indifféremment par le père ou par la mère)
- entre 1 mois et 10 ans (forme à début infantile),
- **entre 10 et 20 ans (forme à début juvénile)**,
- entre 20 et 40 ans (forme débutant à l'âge adulte ou « forme classique »),
- après 40 ans (forme d'apparition tardive).

Atteinte neuromusculaire

- la myotonie (retard de relâchement les muscles après une contraction) :
 - Ms (mains) , Mi , face (yeux)
 - favorisée par le froid,
 - diminue après un échauffement progressif du muscle.
- Atteinte motrice : Une faiblesse et une atrophie musculaire.
- Visage: allongé , ptosis
- Dysphonie/Dysarthrie
- des difficultés à relever la tête en position allongé
- Des difficultés à monter les escaliers (raideurs) .
- Parfois une dysmorphie avec palais ogival est observée chez tous les patients atteints de la forme congénitale

Air de famille

- Clinique : **Myotonie**
- HyperCK (parfois)
- ENMG : Repos: **Salves myotoniques**
- Tracé à l'effort : **myogène**

Test d'effort bref : un effet amplificateur du froid (diminution significative mais transitoire de l'amplitude du potentiel global d'action musculaire après le premier test d'effort bref).

- Génétique : **Confirmation**

Atteinte multi systémique :

- Ophtalmologiques (cataracte chez l'adulte)
- Endocriniens (hypofertilité , diabète)
- Calvitie , cheveux très fins
- Les troubles cognitifs et émotionnels (difficultés scolaires chez l'enfant)
- L'atteinte **cardiaque** et respiratoire → le pronostic vital

Table 1 Summary of the consensus recommendations.

Specialty	Disorder	Recommendations
<i>Neurology</i>	Genetic diagnosis	Quantification of the number of CTG trinucleotide repeats Genetic counselling offered to patient and family members
	Muscle strength	Muscle assessment every 2 years Moderate aerobic exercise Mexiletine 150-200 mg/8 h Epworth Sleepiness Scale Modafinil 50-100 mg at breakfast and lunch Neuropsychological assessment
<i>Cardiology</i>	Cognitive impairment	Annual assessment
	Arrhythmia	EP study if PR > 200 ms, QRS > 100 ms, or symptoms present Echocardiogram every 3-5 years
<i>Pulmonology</i>	Cardiomyopathy	Annual clinical assessment
	Ventilatory restriction	Annual spirometry study Annual influenza vaccination Pneumococcal vaccination Polysomnography
<i>Endocrinology</i>	Sleep apnoea/hypopnoea syndrome	Annual EAT-10 assessment
	Dysphagia	Dysphagia study Dietary recommendations
<i>Ophthalmology</i>	Cataracts	Surgery
	Palpebral ptosis	Blepharoplasty
<i>Dermatology</i>	Seborrheic dermatitis	Vitamin D determination
<i>Gastroenterology</i>	Delayed gastric emptying	Prokinetics
	Constipation	Diet rich in fibre; prokinetics; laxatives
	Diarrhoea (bacterial overgrowth syndrome)	Rifaximin 400 mg/12 h for 7 days
	Gallstones	Conventional treatment if symptomatic
<i>Stomatology</i>	Cavities, gingivitis	Dental assessment
<i>Obstetrics</i>	Pregnancy	High-risk pregnancy follow-up
<i>Anaesthesia</i>	Respiratory complications	Consultation with patient's usual pulmonologist
<i>Oncology</i>	Increased incidence of cancer	Conventional screening tests
<i>Further considerations</i>	Risk of inappropriate treatment and management in emergency departments	Emergency care guidelines, emergency or medical alert cards

Vignette clinique 2: Nizar 4 ans

Vignette clinique 2:Nizar 4 ans

« L'enfant qui ne peut pas ouvrir les yeux après avoir pleuré! »

Plainte de la maman de Nizar âgé de 4 ans:

« Mon fils ne peut pas ouvrir les yeux **après avoir éternué ou pleuré!** « Je l'ai constaté très tôt : **5-6 mois** »

- Raideur au démarrage d'un mouvement
- Difficultés à lâcher un jouet
- Amélioration par la répétition du mouvement
- « Phénomène d'échauffement »
- Pas d'aggravation par le froid

- Enfant , issu d'un mariage non consanguin
- Cas similaires: 0
- Grande errance :

Pédiatre: Dystonie palpébrale
Psychogène

Ophthalmologiste: dacryocystite

Examen clinique:

- Pas de déficit moteur franc
- Marche : normale
- **Percussion musculaire: retard de la relaxation , amélioré par la répétition du mouvement**
- **Myotonie palpébrale ++**
- Aspect « un peu athlétique » (Signe de bonne santé pour la maman)

Bilan

CK et LDH: RAS

Calcémie, K+, phosphorémie,
Ionogramme

Bilan cardiovasculaire: RAS (ECG,
EchoCR)

Bilan thyroïdien: RAS

Les patients « s'adaptent » à leur myotonie

ENMG

Neuronographie: normale sur l'ensemble des nerfs.

Détection: **Activité volontaire: tracé normal**

Activité de repos: **Décharges myotoniques**

DIAGNOSTIC?

Syndromes myotoniques non dystrophiques :
Thomsen ou Becker?

Pas de génétique

Syndromes myotoniques de l'enfant

SM non dystrophiques

myotonie congénitale de Becker

myotonie congénitale de Thomsen

les myotonies du canal sodium

la paramyotonie congénitale

Syndromes dystrophiques

Maladie de Steinert
DM type 1

POMM
DM type 2

Canalopathies musculaires

SM non dystrophiques

Défaut de relaxation (hyperexcitabilité)

myotonie congénitale de Becker

myotonie congénitale de Thomsen

les myotonies du canal sodium

la paramyotonie congénitale

Paralysies périodiques

Défaut de contraction (hypoexcitabilité)

le syndrome d'Andersen-Tawil.

la paralysie périodique normokaliémique,

la paralysie périodique hyperkaliémique,

les paralysies périodiques hypokaliémiques

Canalopathies musculaires

des anomalies génétiques dans un canal ionique voltage dépendant

canal chlore
codé par le gène *CLNC-1*).

canal calcium
codé par le gène *CACNIAS*)

canal sodium
codé par le gène *SCNA4*),

canal potassium
(codé par les gènes *KCNJ2* ou *KCNJ5*),

Guidelines on clinical presentation and management of nondystrophic myotonias

Bas C. Stunnenberg, MD^{#1}, Samantha LoRusso, MD^{#2}, W. David Arnold, MD², Richard J. Barohn, MD³, Stephen C. Cannon, MD, PhD⁴, Bertrand Fontaine, MD, PhD⁵, Robert C. Griggs, MD⁶, Michael G. Hanna, FRCP, FMedSci⁷, Emma Matthews, MRCP, PhD⁷, Giovanni Meola, MD, PhD^{8,9}, Valeria A. Sansone, MD, PhD^{9,10}, Jaya R. Trivedi, MD¹¹, Baziel G.M. van Engelen, MD, PhD¹, Savine Vicart, MD⁵, Jeffrey M. Statland, MD³

Published in final edited form as: Muscle Nerve. 2020 October ; 62(4): 430–444.
doi:10.1002/mus.26887.

TABLE 1. *Clinical and Electrodiagnostic Features of the Chloride Channel Nondystrophic Myotonias*

	Thomsen's Disease Variants			Becker's Disease
	Thomsen's Disease	Fluctuating Myotonia Congenita	Myotonia Levoir	
Clinical Myotonia	Moderate: Generalized (upper extremity and face > lower extremity)	Fluctuating (mild to moderate): Generalized (lower extremity, ocular, and masticatory muscles commonly affected)	Mild to moderate: Generalized (predominantly grip)	Moderate to severe: Generalized (lower extremity > upper extremity)
Age of Onset	Early first decade	Late first decade	First decade to early second decade	Late first decade
Inheritance	Dominant	Dominant	Dominant	Recessive
Chromosome	Chromosome 7q	Chromosome 7q	Chromosome 7q	Chromosome 7q
Potassium Sensitivity	None	*None	*None	None
Effect of Exercise	Myotonia relieved	Myotonia relieved	*Myotonia relieved	Myotonia relieved
Effect of Cold	Can worsen myotonia	Worsening myotonia	None to minimal	Can worsen myotonia in hands and legs
Paradoxical Myotonia	No	No	No	No
Warm Up Effect	Yes	*Yes	*Yes	Yes
Treatment	Mexiletine, quinine, procainamide, acetazolamide	Mexiletine, quinine, procainamide, acetazolamide	Mexiletine, quinine, procainamide, acetazolamide	Mexiletine
Other Provocative Stimuli	Movement after prolonged rest, pregnancy, emotional surprise	Movement after rest, cold, pregnancy, fasting state, emotional stress	Movement after rest or maintenance of posture	Movement after rest or maintenance of posture
Alleviating Factors	Repeated exercise	*	*	Repeated exercise
Episodic Weakness	No	No	No	Variable: typically transient (lasting seconds) and proximal
Progressive Weakness	No	No	*No	Rare
Muscle Hypertrophy	Yes	No	No	Yes (mostly at the lower extremities) distal atrophy may also occur
Pain	*No	Yes	*No	Rare
Nerve Conduction Studies	Normal, repetitive stimulation: may see moderate decremental response	Normal, repetitive stimulation normal	*Normal	Decremental response to repetitive stimulation
Electrical Myotonia	Proximal and distal	Proximal and distal	Present	Proximal and distal
Motor Unit Action Potentials	Normal	*	*	Normal, occasionally myopathic
Fibrillation Potentials	*	*	*	*
Electrodiagnostic Effect of Cold Exposure	Increased myotonia duration	*	*	*Increased myotonia, some say no effect

Deux myotonies congénitales non dystrophiques: canalopathies Cl

Thomsen

- Le médecin danois Thomsen
- **AD**, garçons ++
- **Cas sporadiques**
- Age de début : tôt la naissance
- Cris étranglés
- **Myotonie palpébrale à l'éternuement ou lors des pleurs**
- Aggravation par le froid, les émotions
- **Phénomène d'échauffement (warming effect)**
- Myotonie s'aggrave jusqu' à la puberté puis diminue
- Aspect Herculéen (-marqué), hypertrophie musculaire
- Compatible avec une vie normale
- ENMG : Salves /Tracé normal

Becker

- **AR**, plus fréquente que AD
- **Cas isolés**
- Age de début: 5-12 ans
- Myotonie aux MI
- Déficit moteur aux M S
- **Phénomène d'échauffement (warming effect)**
- Aggravation par le froid, les émotions
- **Aspect Herculéen** hypertrophie musculaire
- Faiblesse musculaire dans 50%, corrigée par l'effort
- Plus sévère
- Aggravation progressive (20-30ans)
- Compatible avec une vie normale
- ENMG : Salves /tracé parfois myopathique

Mutation du gène CLC1 chromosome 7 codant le canal chlore musculaire

Canal chlore

Le gène *CLCN1* code un canal ionique qui permet l'entrée et la sortie du chlore dans les cellules des muscles squelettiques. Ce canal joue un rôle déterminant dans la contraction et le relâchement musculaires. La mutation dans ce gène responsable de la myotonie congénitale

Gène CLCN1, Chromosome 7

Plusieurs types de mutation
(faux sens, non sens,
délétion, insertion)

Le type de mutation ne
permet pas de prédire le
caractère héréditaire R/D

Intérêt de l'examen clinique
et ENMG des collatéraux et
des ascendants

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Journal of Electromyography and Kinesiology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jelekin

The needle EMG findings in myotonia congenita

Monika Nojszewska^a, Anna Lusakowska^a, Malgorzata Gawel^a, Janusz Sierdzinski^{b,*}, Anna Sulek^c,
Wioletta Krysa^c, Ewelina Elert-Dobkowska^c, Andrzej Seroka^a, Anna M. Kaminska^a,
Anna Kostera-Pruszczyk^a

^a Department of Neurology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

^b Department of Medical Informatics and Telemedicine, Medical University of Warsaw, Poland

^c Department of Genetics, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland

Etiologies

MALADIES MYOTONIQUES

Décharge myotonique

20-80 Hz (parfois 150)

Diminue Progressivement

Piqué d'avion

insertion
contraction
percussion musculaire
Renforcé par le froid

Physiopatho.

hyperexcitabilité
de la f.m.

Décharges myotoniques

- 0 pas de salves
- + salves provoquée
- ++ salves spontanées
- +++ salves subintrantes

C'est la variation de la fréquence
un son musical caractéristique
« bombardier en piqué ».

Syndromes myotoniques de l'enfant

```
graph TD; A[Syndromes myotoniques de l'enfant] --> B[SM dystrophiques]; A --> C[Syndromes non dystrophiques]; B --> B1[Maladie de Steinert DM1]; B --> B2[PROMM DM2]; C --> C1[La myotonie congénitale de Becker]; C --> C2[La myotonie congénitale de Thomsen]; C --> C3[Les myotonies du canal sodium]; C --> C4[La paramyotonie congénitale];
```

SM dystrophiques

Maladie de Steinert
DM1

PROMM
DM2

Syndromes non dystrophiques

La myotonie congénitale de Becker

La myotonie congénitale de Thomsen

Les myotonies du canal sodium

La paramyotonie congénitale

	Début	Myotonie	Muscle
Thomsen	0-puberté	++ warm-up	hypertrophie musculaire
Becker	5-12	+++ warm-up	Hypertrophie musculaire faiblesse
Steinert	0-adulte	Méconnue Warm-up	Dystrophie musculaire: distale, face, cou

	Génétique	Transmission	Chromo.	Gène	Mécanisme
Steinert		AD	19q13.3	DMPK	amplification d'une répétition CTG (>50)
Thomsen		AD		canal Cl musculaire	
Becker		AR	7q35	CLCN1	mutation

	Décharge myoto	Signe myogène	SNR
Steinert	+	+	
Thomsen	+	0	
Becker	+	+/-	<p>40 chocs à 10 Hz décrément > 25%</p> <p>2-3 Hz décrément (et réduction de la taille de la réponse M) max. à froid, 3' après exercice court de 20''</p>

Take home messages.....

- Le diagnostic clinique est facile (y penser) : MYOTONIE
Steinert → « **air de famille des patients** », faciès particulier
Thomsen /Becker : **Aspect herculéen**
- Génétiques : AD (Steinert et Thomsen) , AR (Becker)
- L'ENMG est facile : Décharges myotoniques
Tracé myopathique → Steinert

Eviter l'errance diagnostique

Take home messages.....

- Surveillance pluridisciplinaire : **Cardiologiques (Steinert)**
- **L'anti-épileptique et l'antiarythmique ne sont pas automatiques (canalopathies CI, en fonction de la gêne)** Les patients apprennent à vivre avec la maladie et à la gérer
- Traitement non médicamenteux (kiné etc)
- **Education thérapeutique +++**
- **Accompagnement (parents et malades)**

Merci pour votre attention

mahmoudineuro@gmail.com